

Durée : 3 heures

Baccalauréat ES Amérique du Nord mai 2004

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.
Des éléments de formulaire sont joints au sujet.
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

Les parties A et B sont indépendantes.

À la rentrée scolaire, on fait une enquête dans une classe de sixième comprenant 25 élèves.

Partie A :

On sait que, dans cette classe, 48 % des élèves ont 11 ans, $\frac{1}{5}$ ont 13 ans et les autres ont 12 ans. Ces élèves utilisent deux types de sacs de cours : le sac à dos ou le cartable classique. 15 élèves, dont les $\frac{2}{3}$ ont 11 ans, ont acheté un cartable classique ; les autres, dont la moitié ont 12 ans, ont acheté un sac à dos.

1. Recopier le tableau suivant sur votre copie et le compléter à l'aide des données de l'énoncé :

	Sac à dos	Cartable	Total
11 ans			
12 ans			
13 ans			
Total			25

2. On interroge au hasard un élève de cette classe.
On note : S l'évènement : « l'élève a un sac à dos ».
C l'évènement : « l'élève a un cartable ».
T l'évènement : « l'élève a treize ans ».
 - a. Montrer que $P(S) = 0,4$.
 - b. Calculer $P(C \cap T)$.
3. On interroge successivement et de manière indépendante trois élèves de cette classe ; quelle est la probabilité qu'exactement deux d'entre eux aient un sac à dos ?

Partie B :

À leur inscription, ces élèves doivent souscrire une assurance scolaire ; deux types de contrats annuels sont proposés. D'après des études statistiques, le contrat A dont le coût est de 20 € est choisi avec une probabilité de 0,7 et le contrat B dont le coût est de 30 € est choisi avec une probabilité de 0,3.

De plus, le collège propose une adhésion facultative au foyer coopératif, d'un montant de 15 €.

Indépendamment du contrat d'assurance choisi, 40% des élèves prennent une carte d'adhérent du foyer.

On note : A l'évènement : « l'élève a choisi le contrat A »

B l'évènement : « l'élève a choisi le contrat B » -

F l'évènement : « l'élève est adhérent du foyer ».

1. Construire l'arbre des probabilités associé à la situation décrite ci-dessus.

2. Quelle est la probabilité qu'un élève ait pris le contrat B et soit adhérent du foyer ?
3. À chaque élève pris au hasard, on associe le coût X de son inscription (assurance scolaire plus adhésion éventuelle au foyer) ;
 - a. Quelles sont les valeurs possibles de ce coût ?
 - b. Établir la loi de probabilité de ce coût et présenter le résultat dans un tableau.
 - c. Calculer l'espérance mathématique de cette loi. Quelle interprétation peut-on en donner ?

EXERCICE 2**5 points****Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité**

Une grande entreprise publie chaque année son chiffre d'affaires, en millions d'euros.

Le tableau ci-dessous donne les chiffres d'affaires des années 1995 à 2001.

Année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6
Chiffre d'affaires y_i en millions d'euros	20,4	24,2	33,8	38,6	49	53,9	59,29

Le nuage des points M_i , associé à la série statistique $(x_i ; y_i)$ dans un plan rapporté à un repère orthogonal est donné en **annexe**.

1. Répondre sans justification par Vrai ou Faux aux quatre affirmations suivantes :
Les pourcentages sont arrondis au dixième.
 - a. Entre 1997 et 1998, le chiffre d'affaires a augmenté de 14,2 % ;
 - b. Entre 2000 et 2001, l'augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires a été la même qu'entre 1999 et 2000 ;
 - c. Entre 1995 et 2001, l'augmentation annuelle moyenne, en pourcentage, du chiffre d'affaires a été d'environ 31,8 %
 - d. On considère le nuage des points $M_i (x_i ; y_i)$. Les coordonnées du point moyen de ce nuage sont (3 ; 38,6).

On cherche maintenant à faire des prévisions sur le chiffre d'affaires pour l'année 2004 en utilisant plusieurs méthodes.

2.
 - a. Expliquer pourquoi le nuage de points donné en annexe montre qu'un ajustement affine peut être envisagé.
 - b. Tracer la droite d_1 passant par M_0 et M_6 ; par lecture graphique, déterminer une prévision n_1 du chiffre d'affaires pour l'année 2004.
 - c. À l'aide de la calculatrice, donner une équation de la droite d_2 , droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés, en arrondissant les coefficients au centième le plus proche. En déduire une prévision n_2 du chiffre d'affaires pour l'année 2004.
3. On remarque que les valeurs du chiffre d'affaires correspondant aux années 1999, 2000 et 2001 forment une suite géométrique ; on pose donc $u_0 = 49$, $u_1 = 53,9$ et $u_2 = 59,29$.
 - a. Calculer la raison de cette suite.
 - b. Calculer la valeur de u_5 pour cette suite géométrique. Comment peut-on l'interpréter ?


EXERCICE 2

5 points

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

On considère le graphe G_1 ci-dessous :

- Justifier les affirmations suivantes :
 - Le graphe G_1 admet au moins une chaîne eulérienne.
 - La chaîne DABCFBEFAE n'est pas une chaîne eulérienne de G_1 .
- Déterminer un sous-graphe complet de G_1 , ayant le plus grand ordre possible. En déduire un minorant du nombre chromatique γ de ce graphe.
- Déterminer un majorant de ce nombre chromatique. (On justifiera la réponse).
- En proposant une coloration du graphe G_1 , déterminer son nombre chromatique.

Partie B

Soit la matrice M d'un graphe orienté G_2 dont les sommets A, B, C, D et E sont pris dans l'ordre alphabétique.

$$\text{On donne } M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } M^3 = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 4 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 5 & 3 & 6 \\ 5 & 7 & 4 & 3 & 6 \\ 3 & 5 & 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- Construire le graphe G_2 .
- Déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 reliant B à D. Les citer toutes.


EXERCICE 3

4 points

Commun à tous les candidats

La représentation graphique (\mathcal{C}) ci-dessous est celle d'une fonction f définie sur $[-2; 3]$ dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) . On note f' la fonction dérivée de f .La courbe (\mathcal{C}) vérifie les propriétés suivantes :

Les points ainsi marqués \bullet sont à coordonnées entières et appartiennent à la courbe tracée, la tangente au point d'abscisse -1 est parallèle à l'axe des abscisses, la tangente au point d'abscisse 0 coupe l'axe des abscisses en $x = 2$.



1. Donner une équation de la tangente au point d'abscisse 0.
2. Donner les variations de f
3. Une des quatre courbes ci-dessous représente graphiquement la fonction f' . Déterminer celle qui la représente, en justifiant l'élimination de chacune des trois autres courbes.




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4

4. On admet que la fonction f est définie par une expression de la forme $f(x) = (ax + b)e^{kx}$ où a , b et k sont des nombres réels.
 - a. Déterminer f' en fonction de a , b et k .
 - b. En utilisant la question précédente et les propriétés de la courbe (\mathcal{C}) données au début de l'exercice, calculer a , b et k .

EXERCICE 4

5 points


Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{2(1 + \ln x)}{x}.$$

1.
 - a. Résoudre dans I l'équation $f(x) = 0$; (Calculer la valeur exacte de la solution, puis en donner une valeur approchée à 10^{-2} près.)
 - b. Résoudre dans I l'inéquation $f(x) > 0$.

ANNEXE À L'EXERCICE 2 (non spécialistes)
À rendre avec la copie



MATHÉMATIQUES – SÉRIE ES

Eléments de formulaire

Probabilités**Probabilité conditionnelle de B sachant A**

$P_A(B)$ est définie par $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$.

Cas où A et B sont indépendants : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Formule des probabilités totales

Si les événements B_1, B_2, \dots, B_n forment une partition de Ω alors

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n).$$

Espérance mathématique

Une loi de probabilités étant donnée, son espérance mathématique est

$$E = \sum_{i=1}^n p_i x_i.$$

Analyse**Limites**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Dérivées et primitives

Les hypothèses permettant d'utiliser les formules doivent être vérifiées par le candidat.

$$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$